

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

S T U D Y

You have Downloaded, yet Another Great  
Resource to assist you with your Studies ☺

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ [www.saexamapers.co.za](http://www.saexamapers.co.za)



SA EXAM  
PAPERS



**GAUTENG PROVINCE**  
EDUCATION  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

# VOORBEREIDENDE EKSAMEN

## 2022

**10842**

**FISIESE WETENSKAPPE: CHEMIE**

**VRAESTEL 2**

**TYD:** 3 uur

**PUNTE:** 150

**16 bladsye + 4 inligtingsblaie + 1 antwoordblad**

**FISIESE WETENSKAPPE: Vraestel 2**



10842A

**X05**



**INSTRUKSIES EN INFORMASIE:**

1. Hierdie vraestel bestaan uit 9 vrae. Beantwoord AL die vroegte in die ANTWOORDBOEK.  
Gebruik die grafiekpapier op die laaste bladsy om VRAAG 5.3.1 en VRAAG 5.3.3 te beantwoord.
2. Begin elke vraag op 'n NUWE bladsy.
3. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik word.
4. Laat EEN reël oop tussen subvrae, byvoorbeeld, tussen VRAAG 2.1 en VRAAG 2.2.
5. Jy mag 'n nie-programmeerbare sakrekenaar gebruik.
6. Jy mag toepaslike wiskundige instrumente gebruik.
7. Jy word aangeraai om die aangehegte INLIGTINGSBLAAIE te gebruik.
8. Toon ALLE formules en vervangings in ALLE berekening aan.
9. Rond die finale numeriese antwoorde af tot 'n minimum van TWEE desimale plekke.
10. Gee kort besprekings, ensovoorts waar nodig.
11. Skryf netjies en leesbaar.

### VRAAG 1: MEERVOUDIGEKEUSE-VRAE

Vier opsies word as moontlike antwoorde op die volgende vrae gegee. Elke vraag het slegs EEN korrekte antwoord. Skryf slegs die letter (A – D) langs die vraagnommers (1.1 tot 1.10) in die ANTWOORDBOEK neer, bv. 1.11 D.

1.1 Oorweeg die gekondenseerde struktuurformule:




Identifiseer die naam van die funksionele groep in die formule.

- A Karboksielsuur
  - B Karboksielgroep
  - C Ketoon
  - D Karbonielgroep
- (2)

1.2 Watter van die volgende is die empiriese formule van 1,2-dichloroethane?

- A  $\text{CHCl}$
  - B  $\text{CH}_2\text{Cl}$
  - C  $\text{CHCl}_2$
  - D  $\text{C}_2\text{H}_4\text{Cl}_2$
- (2)


1.3 Oorweeg die struktuurformule van die organiese verbinding hieronder.



Watter van die volgende stellings oor die verbinding hierbo is KORREK?

- A 2,2,4-trimetielpent-2-ene
  - B 2,2,4-trimetielpent-3-ene
  - C 2,4,4-trimetielpent-2-ene
  - D 2,4,4-trimetielpent-3-ene
- (2)

- 1.4 Uit die volgende opsies kies die EEN wat die beste verduidelik waarom katalisators so baie in chemiese reaksies gebruik word:
- A Katalisators kan gebruik word om die ewewig in die gewenste rigting te dryf.
  - B Katalisators verminder die terugwaartse reaksie.
  - C Katalisators het geen effek op die terugwaartse reaksies nie.
  - D Katalisators veroorsaak dat die voorwaartse en terugwaartse reaksies teen 'n vinniger tempo voortgaan.
- 1.5 Bestudeer die volgende grafiek en benoem punt X uit die volgende keuses.



- A Aktiveringsergie
- B Geaktiveerde kompleks
- C Aktiveringskompleks
- D Geaktiveerde energie

- 1.6 Die vergelyking hieronder verteenwoordig 'n chemiese reaksie in ewewig in 'n geslote houer.



Watter van die volgende veranderinge sal die opbrengs van  $\text{HI}(\text{g})$  in die bogenoemde reaksie verhoog?

- A Verhoging in die temperatuur
  - B Verlaging in die temperatuur
  - C Verhoog die druk deur die volume te verminder
  - D Verlaag die druk deur die volume te vermeerder
- (2)
- 1.7 Watter van die volgende oplossings, elk met 'n konsentrasie van  $0,1 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ , het die hoogste pH?
- A  $\text{HNO}_3(\text{aq})$
  - B  $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{aq})$
  - C  $\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{aq})$
  - D  $\text{CH}_3\text{COOH} (\text{aq})$
- (2)
- 1.8 'n Oplossing van etanoësuur (asynsuur) word getitreer teen 'n standaard natriumhidroksiedoplossing. Watter van die volgende indikators sal die geskikste vir hierdie titrasie wees?

	Indikator	pH reeks van die indikator
A	Fenolftaleïen	8,3 – 10
B	Metieloranje	3,1 – 4,4
C	Broomtimolblou	6,0 – 7,6
D	Universele indikator	Verander kleur oor 'n wye reeks pH waardes





(2)

- 1.9 Watter van die volgende gee die rigting, sowel as die medium, korrek waarin elektrone in 'n galvaniese sel beweeg?

	RIGTING	MEDIUM
A	katode na anode	soutbrug
B	anode na katode	eksterne draad
C	katode na anode	eksterne draad
D	anode na katode	soutbrug

(2)

- 1.10 Watter van die volgende halfreaksies vind plaas by die katode tydens die elektrolise van 'n gekonsentreerde  $\text{NaCl}$  oplossing?







(2)

[20]

**VRAAG 2 (Begin op 'n nuwe bladsy.)**

Die volgende tipes formules verteenwoordig organiese verbindings. Bestudeer die tabel hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

A		B		C	
D	$\text{CH}_3\text{CHOHCH}_3$	E	2,4-dimetylpent-1-ene	F	2-metylpropan-2-ol
G					

2.1 Van die tabel hierbo, beskou verbinding **B**. Skryf die:

2.1.1 Homoloë reeks waaraan verbinding **B** behoort (1)

2.1.2 IUPAC naam van verbinding **B** (2)

2.2 'n Alkohol en 'n suur word verhit in die teenwoordigheid van gekonsentreerde swaelsuur om verbinding **B** te vorm. Skryf die:

2.2.1 Rol van die gekonsentreerde **swaelsuur** in hierdie reaksie neer (1)

2.2.2 Name van die alkohol en die organiese suur neer wat gebruik word om verbinding **B** te maak (2)

2.2.3 Naam van die proses wat hier plaasvind neer (1)

2.3 Van die tabel hierbo, oorweeg verbinding **C**.

2.3.1 Skryf die naam van die funksionele groep van verbinding **C** neer. (1)

2.3.2 Aan watter homoloë reeks behoort verbinding **C**? (1)

2.3.3 Onderskei tussen die terme *funksionele groep* en *homoloë reeks*. (2)

2.4 Van die tabel hierbo, oorweeg verbindings **A**, **D** en **F**.

2.4.1 Skryf die homoloë reeks waaraan hulle behoort, neer. (1)

2.4.2 **Verbinding A en D** is isomere. As watter **tipe isomere** sal hulle geklassifiseer word? (1)

2.4.3 Teken die struktuurformule vir verbinding **F**. (3)

2.5 Skryf die:


2.5.1 IUPAC naam vir verbinding **G** neer. (3)

2.5.2 struktuurformule van verbinding **E** neer. (2)

[21]

**VRAAG 3 (Begin op 'n nuwe bladsy.)**

3.1 Bestudeer die volgende twee strukture en beantwoord die vrae wat volg.



- 3.1.1 Verbinding **A** en **B** is funksionele isomere. Definieer die term *funktionele isomeer*. (2)
- 3.1.2 Skryf die IUPAC-naam van verbinding **B** neer. (2)
- 3.1.3 Hoe vergelyk die kookpunt van **A** met dié van PENTAN-1-OL? Skryf slegs GROTER AS, GELYK AAN of LAER AS, neer. (1)
- 3.1.4 Verduidelik jou antwoord op VRAAG 3.1.3 volledig deur te verwys na die tipe intermolekulêre kragte teenwoordig in elk van hierdie verbindings. (3)
- 3.1.5 Hoe sal die dampdruk van verbinding **B** vergelyk met dié van PENTAN-1-OL? Skryf slegs HOËR AS, LAER AS of GELYK AAN, neer. Verduidelik die antwoord volledig. (3)
- 3.2 Leerders gebruik verbinding **C** tot **E**, om EEN faktor wat die **kookpunt** van organiese verbinding beïnvloed, te ondersoek.


<b>C</b>	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	-1 °C
<b>D</b>	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	36,1 °C
<b>E</b>	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	69 °C

- 3.2.1 Definieer die term *kookpunt*. (2)
- 3.2.2 Skryf die onafhanklike veranderlike vir hierdie ondersoek neer. (1)
- 3.2.3 Skryf die tipes Van der Waals-krag neer wat tussen die organiese verbinding voorkom. (1)
- 3.2.4 Skryf die gevolgtrekking wat gemaak kan word oor die **kookpunt** van reguit-ketting alkane. (2)

[17]

#### VRAAG 4 (Begin op 'n nuwe bladsy.)

Die meeste organiese verbindings kan reaksies ondergaan om 'n verskeidenheid organiese verbindings te produseer. Party onvolledige reaksies word hieronder gegee.




- 4.1 Oorweeg reaksie **A**. Identifiseer en skryf die tipe reaksie wat plaasvind neer. (1)
- 4.2 Reaksie **B** verteenwoordig 'n hidrasie reaksie:
  - 4.2.1 Defineer die *hidrasie reaksie*. (2)
  - 4.2.2 Skryf die **naam** of **formule** van die katalisator wat vir hierdie reaksie gebruik word. (1)
- 4.3 Tydens reaksie **C** word 'n spesifieke reël gevolg om die hoofproduk te bepaal wanneer HBr bygevoeg word.
  - 4.3.1 Skryf TWEE reaksietoestande vir hierdie reaksie neer. (2)
  - 4.3.2 Gebruik struktuurformules en skryf die gebalanseerde vergelyking vir hierdie reaksie neer. (3)
- 4.4 Identifiseer die tipe reaksie wat plaasvind by:
  - 4.4.1 Reaksie **D** (1)
  - 4.4.2 Reaksie **F** (1)
- 4.5 Reaksie **E** is 'n hidrogenasie reaksie.
  - 4.5.1 Skryf die TWEE reaksiekondisies vir die reaksie neer. (2)
  - 4.5.2 Hierdie reaksie word algemeen in die industrie gebruik. Noem EEN gebruik vir hidrogenasie in die voedselbedryf. (1)


[14]

**VRAAG 5 (Begin op 'n nuwe bladsy.)**



- 5.1 Die grafiek hieronder toon die verandering in potensiële energie vir die reaksie waar kalksteen in kalk verander word. Die gebalanseerde vergelyking vir hierdie reaksie is:



- 5.1.1 Is die voorwaartse reaksie eksotermies of endotermies? (1)
- 5.1.2 Bereken die reaksiewarmte vir die voorwaartse reaksie. (2)
- 5.1.3 Skryf die aktiveringsenergie vir die terugwaartse reaksie neer. (1)
- 5.2 Die volgende grafiek verteenwoordig die aantal deeltjies teen 'n spesifieke hoeveelheid kinetiese energie van die molekules. Die data vir monsters **R** en **S** is by verskillende temperature verkry wat die tempo van reaksie beïnvloed.



- 5.2.1 Definieer die term *tempo van reaksie*. (2)
- 5.2.2 Wat verteenwoordig die area regs van lyn T? (1)
- 5.2.3 Watter monster was by 'n hoër temperatuur? Skryf slegs MONSTER R of MONSTER S neer. (1)
- 5.2.4 Verduidelik die antwoord op VRAAG 5.2.3 deur die botsingsteorie te gebruik. (3)
- 5.3 11 g magnesiumlint reageer met 'n  $0,25 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$  soutuur oplossing by 'n temperatuur van  $25^\circ\text{C}$  volgens die volgende gebalanseerde vergelyking:



'n Tabel van die resultate word hieronder gegee:

Tyd verloop (minute)	Volume $\text{H}_2\text{(g)}$ ( $\text{cm}^3$ )
0	0
0,5	17
1,0	25
1,5	30
2,0	33
2,5	35
3,0	35


- 5.3.1 Gebruik die grafiekpapier wat op die laaste bladsy van die vraestel gedruk is. Plot 'n grafiek van hierdie resultate. (2)
- 5.3.2 Gebruik die grafiek en verduidelik wat gebeur het met die reaksie tussen 2 minute en 3 minute. (1)
- 5.3.3 In 'n tweede eksperiment het die konsentrasie van die soutuur verander van  $0,25 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$  na  $1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ . Teken 'n nuwe kurwe op dieselfde grafiekpapier om te wys watter effek dit sal hê. Benoem die nuwe kurwe X. (2)
- 5.3.4 Aanvaar die molêre gas volume by  $25^\circ\text{C}$  is  $24,47 \text{ dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$ . Bereken die volume suur wat in die eerste eksperiment gebruik is toe die reaksie voltooi is. (4)

[20]


b.o.

### VRAAG 6 (Begin op 'n nuwe bladsy.)

- 6.1 Die gebalanseerde vergelyking hieronder verteenwoordig die reaksie wat ewewig bereik het in 'n verseëlde houer.



Om die opbrengs van ammoniak te verhoog, word aanpassings gemaak aan die temperatuur, druk en konsentrasie van die ewewigsmengsel. Die grafiek hieronder verteenwoordig die resultate wat verkry is.



Identifiseer die verandering wat op elk van die volgende tye aan die ewewigsmengsel aangebring is.

6.1.1  $t_1$  (1)

6.1.2  $t_2$  (1)

6.1.3  $t_3$  (1)

6.2 Stel *Le Chatelier se beginsel* in woorde. (2)

6.3. Die druk van die reaksiemengsel in VRAAG 6.1 hierbo word versteur deur die volume van die verseëlde houer te vermeerder.

6.3.1 Hoe sal die verandering die opbrengs van  $\text{NH}_3(\text{g})$  beïnvloed? Skryf slegs VERHOOG, VERLAAG of BLY DIESELFDE, neer. (1)

6.3.2 Gebruik Le Chatelier se beginsel om die antwoord op VRAAG 6.3.1 te verduidelik. (3)

6.4 5 mol  $\text{N}_2$  en 5 mol  $\text{H}_2$  word nou in 'n leë  $5 \text{ dm}^3$  houer verseël. Ewewig word bereik by  $450^\circ\text{C}$ . By ontleding van die ewewigsmengsel word dit bevind dat die massa van  $\text{NH}_3$ , 20,4 g is.

Bereken die waarde van die ewewigkonstante( $K_c$ ) by  $450^\circ\text{C}$ . (9)


6.5 Die temperatuur word nou verhoog tot  $700^\circ\text{C}$ . Wat sal gebeur met die waarde van  $K_c$  by hierdie temperatuur sodra 'n nuwe ewewig bereik is? Skryf slegs BLY DIESELFDE, VERHOOG of VERLAAG, neer. (2)

[20]

**VRAAG 7 (Begin op 'n nuwe bladsy.)**

7.1 Definieer die term *suur* volgens die Arrhenius teorie. (2)

7.2 Oorweeg die volgende suurbasis reaksies.



7.2.1 Uit reaksies X en Y, identifiseer die reaksie wat die Arrhenius teorie illustreer. (1)


7.2.2 Skryf 'n gebalanseerde vergelyking vir die hidrolise van die  $\text{NH}_4^+$  ione, neer. (3)

7.2.3 Sal die gevormde oplossing van VRAAG 7.2.2 suur, alkalies of neutraal wees? Gee 'n rede vir jou antwoord. (2)

7.3 'n Natriumhidroksied oplossing word berei deur 4 g natriumhidroksied in water op te los om 'n  $500 \text{ cm}^3$ -oplossing te vorm.

7.3.1 Bereken die konsentrasie van die natriumhidroksied oplossing. (3)

7.3.2 Gedurende 'n titrasie, neutraliseer  $12,5 \text{ cm}^3$  van die natriumhidroksied oplossing  $25 \text{ cm}^3$  swaelsuur volgens die volgende gebalanseerde chemiese vergelyking:




Bereken die pH van die  $\text{H}_2\text{SO}_4$  oplossing.

(7)

[18]

## **VRAAG 8 (Begin op 'n nuwe bladsy.)**

Die galvaniese sel wat in die diagram hieronder voorgestel word, bestaan uit 'n Ba-elektrode wat in 'n  $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ -oplossing geplaas is, en 'n Cu-elektrode wat in 'n  $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ -oplossing geplaas is. Aanvaar dat die sel onder standaardtoestande werk.



- 8.1 Noem TWEE standaardtoestande waaronder hierdie sel werk. (2)

8.2 Watter halfsel, **A** of **B** is die katode? Skryf slegs **A** of **B**. (1)

8.3 Skryf die halfreaksie wat plaasvind in halfsel **A**. (2)

8.4 Skryf die selnotasie vir hierdie sel neer. (3)

8.5 Bereken die emk van hierdie sel. (4)


8.6 Hoe sal elkeen van die volgende veranderinge die emk waarde van die sel bereken in VRAAG 8.5, beïnvloed? Skryf slegs VERHOOG, VERLAAG of BLY DIESELFDE, neer.

8.6.1 Ammoniumsulfaat word by die bariumnitraat oplossing gevoeg. (1)

8.6.2 Die temperatuur van die oplossings is verhoog. (1)

**VRAAG 9 (Begin op 'n nuwe bladsy.)**

Die diagram hieronder toon 'n elektrolitiese sel wat gebruik word vir die suiwering van koper.



- 9.1 Noem die energie-omskakeling wat in hierdie elektrolitiese sel plaasvind. (2)
- 9.2 Wat sal by die katode waargeneem word? (1)
- 9.3 Skryf die halfreaksie neer wat by die anode plaasvind. (2)
- 9.4 Wat sal gebeur met die kleur van die blou koper (II) sulfaat oplossing gebeur soos die reaksie vorder? (1)  
[6]

**TOTAAL: 150**

**DATA FOR PHYSICAL SCIENCES GRADE 12**  
**PAPER 2 (CHEMISTRY)**

**GEGEWENS VIR FISIESE WETENSKAPPE GRAAD 12**  
**VRAESTEL 2 (CHEMIE)**

**TABLE 1: PHYSICAL CONSTANTS/TABEL 1: FISIESE KONSTANTES**

NAME/NAAM	SYMBOL/SIMBOOL	VALUE/WAARDE
Standard pressure <i>Standaarddruk</i>	$p^{\theta}$	$1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$
Molar gas volume at STP <i>Molêre gasvolume by STD</i>	$V_m$	$22,4 \text{ dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$
Standard temperature <i>Standaardtemperatuur</i>	$T^{\theta}$	273 K
Charge on electron <i>Laai op elektron</i>	$e^-$	$-1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
Avogadro's number <i>Avogadro se nommer</i>	$N_A$	$6,02 \times 10^{23}$

**TABLE 2: FORMULAE/TABEL 2: FORMULES**

$n = \frac{m}{M}$	$n = \frac{N}{N_A}$
$c = \frac{n}{V}$ or/of $c = \frac{m}{MV}$	$n = \frac{V}{V_m}$
$\frac{c_a V_a}{c_b V_b} = \frac{n_a}{n_b}$	$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$
$E_{\text{cell}}^{\theta} = E_{\text{cathode}}^{\theta} - E_{\text{anode}}^{\theta}$ / $E_{\text{sel}}^{\theta} = E_{\text{katode}}^{\theta} - E_{\text{anode}}^{\theta}$	
$E_{\text{cell}}^{\theta} = E_{\text{reduction}}^{\theta} - E_{\text{oxidation}}^{\theta}$ / $E_{\text{sel}}^{\theta} = E_{\text{reduksie}}^{\theta} - E_{\text{oksidasie}}^{\theta}$	
$E_{\text{cell}}^{\theta} = E_{\text{oxidisingagent}}^{\theta} - E_{\text{reducingagent}}^{\theta}$ / $E_{\text{sel}}^{\theta} = E_{\text{oksideermiddel}}^{\theta} - E_{\text{reduseermiddel}}^{\theta}$	

TABLE 3: THE PERIODIC TABLE OF ELEMENTS/TABEL 3: DIE PERIODIEKE TABEL VAN ELEMENTE

1 (I)	2 (II)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (III)	14 (IV)	15 (V)	16 (VI)	17 (VII)	18 (VIII)	
1 H 1	2,1 He 4																	
3 Li 7	1,0 Be 9																	
11 Na 23	0,9 Mg 24	1,2 1,2	1,5 1,2	4 Be 9														
19 K 39	0,8 Ca 40	1,0 1,3	20 Sc 45	21 Ti 48	22 V 51	23 Cr 52	24 Mn 55	25 Fe 56	26 Co 59	27 Ni 59	28 Cu 63,5	29 Zn 65	30 Ga 70	31 Ge 73	32 As 75	33 Se 79	34 Br 80	36 Kr 84
37 Rb 86	0,8 Sr 88	1,0 1,2	38 Y 89	39 Zr 91	40 Nb 92	41 Mo 96	42 Tc 96	43 Ru 101	44 Rh 103	45 Pd 106	46 Ag 108	47 Cd 112	48 In 115	49 Sn 119	50 Sb 122	51 Te 128	52 I 127	54 Xe 131
55 Cs 133	0,7 Ba 137	0,9 1,6	56 La 139	57 Hf 179	72 Ta 181	73 W 184	74 Re 186	75 Os 190	77 Ir 192	78 Pt 195	79 Au 197	80 Hg 201	81 Tl 204	82 Pb 207	83 Bi 209	84 Po 209	85 At 226	86 Rn
0,7 Fr	0,9 Ra 226		88 Ac															

58 Ce 140	59 Pr 141	60 Nd 144	61 Pm	62 Sm 150	63 Eu 152	64 Gd 157	65 Tb 159	66 Dy 163	67 Ho 165	68 Er 167	69 Tm 169	70 Yb 173	71 Lu 175
90 Th 232	91 Pa	92 U 238	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

TABLE 4A: STANDARD REDUCTION POTENTIALS/  
TABEL 4A: STANDAARD REDUKSIEPOTENSIALE

Half-reactions/Halfreaksies	$E^\theta$ (V)
$F_2(g) + 2e^- \rightleftharpoons 2F^-$	+ 2,87
$Co^{3+} + e^- \rightleftharpoons Co^{2+}$	+ 1,81
$H_2O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons 2H_2O$	+1,77
$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 4H_2O$	+ 1,51
$Cl_2(g) + 2e^- \rightleftharpoons 2Cl^-$	+ 1,36
$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightleftharpoons 2Cr^{3+} + 7H_2O$	+ 1,33
$O_2(g) + 4H^+ + 4e^- \rightleftharpoons 2H_2O$	+ 1,23
$MnO_2 + 4H^+ + 2e^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 2H_2O$	+ 1,23
$Pt^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Pt$	+ 1,20
$Br_2(l) + 2e^- \rightleftharpoons 2Br^-$	+ 1,07
$NO_3^- + 4H^+ + 3e^- \rightleftharpoons NO(g) + 2H_2O$	+ 0,96
$Hg^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Hg(l)$	+ 0,85
$Ag^+ + e^- \rightleftharpoons Ag$	+ 0,80
$NO_3^- + 2H^+ + e^- \rightleftharpoons NO_2(g) + H_2O$	+ 0,80
$Fe^{3+} + e^- \rightleftharpoons Fe^{2+}$	+ 0,77
$O_2(g) + 2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons H_2O_2$	+ 0,68
$I_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2I^-$	+ 0,54
$Cu^+ + e^- \rightleftharpoons Cu$	+ 0,52
$SO_2 + 4H^+ + 4e^- \rightleftharpoons S + 2H_2O$	+ 0,45
$2H_2O + O_2 + 4e^- \rightleftharpoons 4OH^-$	+ 0,40
$Cu^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Cu$	+ 0,34
$SO_4^{2-} + 4H^+ + 2e^- \rightleftharpoons SO_2(g) + 2H_2O$	+ 0,17
$Cu^{2+} + e^- \rightleftharpoons Cu^+$	+ 0,16
$Sn^{4+} + 2e^- \rightleftharpoons Sn^{2+}$	+ 0,15
$S + 2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons H_2S(g)$	+ 0,14
$2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons H_2(g)$	<b>0,00</b>
$Fe^{3+} + 3e^- \rightleftharpoons Fe$	- 0,06
$Pb^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Pb$	- 0,13
$Sn^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Sn$	- 0,14
$Ni^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Ni$	- 0,27
$Co^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Co$	- 0,28
$Cd^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Cd$	- 0,40
$Cr^{3+} + e^- \rightleftharpoons Cr^{2+}$	- 0,41
$Fe^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Fe$	- 0,44
$Cr^{3+} + 3e^- \rightleftharpoons Cr$	- 0,74
$Zn^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Zn$	- 0,76
$2H_2O + 2e^- \rightleftharpoons H_2(g) + 2OH^-$	- 0,83
$Cr^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Cr$	- 0,91
$Mn^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Mn$	- 1,18
$Al^{3+} + 3e^- \rightleftharpoons Al$	- 1,66
$Mg^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Mg$	- 2,36
$Na^+ + e^- \rightleftharpoons Na$	- 2,71
$Ca^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Ca$	- 2,87
$Sr^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Sr$	- 2,89
$Ba^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Ba$	- 2,90
$Cs^+ + e^- \rightleftharpoons Cs$	- 2,92
$K^+ + e^- \rightleftharpoons K$	- 2,93
$Li^+ + e^- \rightleftharpoons Li$	- 3,05

Increasing oxidising ability/Toenemende oksiderende vermoë

Increasing reducing ability/Toenemende reducerende vermoë

TABLE 4B: STANDARD REDUCTION POTENTIALS/  
TABEL 4B: STANDAARD REDUKSIEPOTENSIALE

Half-reactions/Halfreaksies	$E^\theta$ (V)
$\text{Li}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Li}$	-3,05
$\text{K}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{K}$	-2,93
$\text{Cs}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cs}$	-2,92
$\text{Ba}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ba}$	-2,90
$\text{Sr}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Sr}$	-2,89
$\text{Ca}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ca}$	-2,87
$\text{Na}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Na}$	-2,71
$\text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mg}$	-2,36
$\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Al}$	-1,66
$\text{Mn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}$	-1,18
$\text{Cr}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cr}$	-0,91
$2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + 2\text{OH}^-$	-0,83
$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}$	-0,76
$\text{Cr}^{3+} + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cr}$	-0,74
$\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}$	-0,44
$\text{Cr}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cr}^{2+}$	-0,41
$\text{Cd}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cd}$	-0,40
$\text{Co}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Co}$	-0,28
$\text{Ni}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ni}$	-0,27
$\text{Sn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Sn}$	-0,14
$\text{Pb}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Pb}$	-0,13
$\text{Fe}^{3+} + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}$	-0,06
$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g})$	0,00
$\text{S} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2\text{S}(\text{g})$	+0,14
$\text{Sn}^{4+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Sn}^{2+}$	+0,15
$\text{Cu}^{2+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}^+$	+0,16
$\text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{SO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}$	+0,17
$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$	+0,34
$2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 + 4\text{e}^- \rightleftharpoons 4\text{OH}^-$	+0,40
$\text{SO}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightleftharpoons \text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$	+0,45
$\text{Cu}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$	+0,52
$\text{I}_2 + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{I}^-$	+0,54
$\text{O}_2(\text{g}) + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}_2$	+0,68
$\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$	+0,77
$\text{NO}_3^- + 2\text{H}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{NO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}$	+0,80
$\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag}$	+0,80
$\text{Hg}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Hg}(\ell)$	+0,85
$\text{NO}_3^- + 4\text{H}^+ + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{NO}(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}$	+0,96
$\text{Br}_2(\ell) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Br}^-$	+1,07
$\text{Pt}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Pt}$	+1,20
$\text{MnO}_2 + 4\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$	+1,23
$\text{O}_2(\text{g}) + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}$	+1,23
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$	+1,33
$\text{Cl}_2(\text{g}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Cl}^-$	+1,36
$\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$	+1,51
$\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}$	+1,77
$\text{Co}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Co}^{2+}$	+1,81
$\text{F}_2(\text{g}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{F}^-$	+2,87

Increasing oxidising ability/Toenemende oksiderende vermoë

Increasing reducing ability/Toenemende reduserende vermoë

Naam: \_\_\_\_\_

5.3 Grafiek wat die verhouding tussen die volume  $H_2(g)$  en tyd aandui

