

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

S T U D Y

You have Downloaded, yet Another Great
Resource to assist you with your Studies ☺

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexamapers.co.za





education

Department of
Education
FREE STATE PROVINCE

**PREPARATORY EXAMINATION
VOORBEREIDENDE EKSAMEN**

GRADE/GRAAD 12

**PHYSICAL SCIENCES: CHEMISTRY (P2)
FISIESE WETENSKAPPE: (V2)**

SEPTEMBER 2023

MARKS/PUNTE: 150

MARKING GUIDELINES/NASIENRIGLYNE


These marking guidelines consist of 15 pages.
Hierdie nasienriglyne bestaan uit 15 bladsye.

QUESTION 1/VRAAG 1


- 1.1 D ✓✓ (2)
1.2 D ✓✓ (2)
1.3 C ✓✓ (2)
1.4 C ✓✓ (2)
1.5 A ✓✓ (2)
1.6 B ✓✓ (2)
1.7 D ✓✓ (2)
1.8 C ✓✓ (2)
1.9 C ✓✓ (2)
1.10 A ✓✓ (2)
[20]

QUESTION 2/VRAAG 2


- 2.1.1 B ✓ (1)
2.1.2 D ✓ (1)
2.1.3 A / B ✓ (1)
2.1.4 B ✓ (1)
2.2.1 Carboxyl/Karboksiel ✓✓ (2)
2.2.2



Memorandum/Nasienriglyne



OR/OF

**Marking criteria/Nasienkriteria:**

- Whole structure correct/Hele struktuur korrek: 2/2
- Only functional group correct/single bonds between carbon atoms: ½
Slegs funksionele groep korrekte/enkelbindings tussen koolstofatome: ½

(2)

2.3.1 3,5-dichloro/dichloor✓ -4-methyl/metiel ✓ octane/oktaan ✓

Marking criteria/Nasienkriteria:

- 3,5-dichloro/dichloor ✓
- 4-methyl/Metiel ✓
- Octane/Oktaan ✓


(3)

2.3.2 Propanone/propan-2-one/Propanoon/propaan-2-een ✓✓ (2)

2.4 Propanal/Propanaal ✓✓ (2)

Memorandum/Nasienriglyne

2.5.1

**Marking criteria/Nasienkriteria:**

- Whole structure correct/Hele struktuur korrek: 2/2
- One methyl substituent/Een metielsubstituent:

Notes/Aantekeninge:


Condensed formulae or semi-structural formula:

Max./Maks. ½

Gekondenseerde formules of semi-struktuurformule:

Molecular formula/Molekulêre formule: 0/2

2.5.2

**Marking criteria/Nasienkriteria:**

- Whole structure correct/Hele struktuur korrek: 2/2
- Only functional group correct/Slegs funksionele groep korrek: ½

(2)

[19]

QUESTION 3/VRAAG 3**3.1.1 Marking criteria/Nasienkriteria:**

If any of the underlined key phrases in the correct context is omitted, deduct 1 mark.

Indien enige van die onderstreepte sleutelfrases in die korrekte konteks weggelaat word, trek 1 punt af.

The pressure exerted by vapour at equilibrium with its liquid in a closed system. ✓✓

Die druk wat uitgeoefen word deur damp by ewewig met sy vloeistof in 'n geslote sisteem. (2)

3.1.2 B ✓

(1)

3.1.3 B/methylpropane/metielpropaan

- Smaller surface area/*Kleiner oppervlakte* ✓
- Weaker intermolecular forces/*Swakker intermolekulêre kragte* ✓
- Less energy needed to break the intermolecular forces/*Minder energie benodig om die intermolekulêre kragte te breek* ✓

A/butane/butaan

- Larger surface area/*Groter oppervlakte* ✓
- Stronger/more intermolecular forces/*Sterker/meer intermolekulêre kragte* ✓
- More energy needed to break the intermolecular forces/*Meer energie benodig om die intermolekulêre kragte te breek* ✓

(3)

3.1.4 One independent variable/same homologous series and are (chain) isomers/same molecular mass and are (chain) isomers. ✓

Een onafhanklike veranderlike/dieselfde homoloë reeks en is (ketting) isomere/dieselfde molekulêre massa en is (ketting) isomere.

(1)

3.2

- propan -1-ol ✓
- propan -1-ol has hydrogen bonding, (dipole-dipole and London forces) between molecules propanone has dipole-dipole forces (and London forces). ✓
- Intermolecular forces in propan-1-ol are stronger than intermolecular forces in propanone. ✓
- propaan -1-ol
- propaan -1-ol het waterstofbinding, (dipool-dipool en Londen-kragte) tussen molekules propanoon het dipool-dipool kragte (en Londen-kragte).
- Intermolekulêre kragte in propaan-1-ol is sterker as intermolekulêre kragte in propanoon.

OR/OF

Memorandum/Nasienriglyne

- Intermolecular forces in propanone are weaker than intermolecular forces in propan-1-ol.
- More energy needed to overcome or break intermolecular forces/van der Waals forces in propan-1-ol ✓ than propanone.

OR

- Less energy needed to overcome or break intermolecular forces/Van der Waals forces in compound D than compound C.
- *Intermolekulêre kragte in propanoon is swakker as intermolekulêre kragte in propaan-1-ol.*
- *Meer energie benodig om intermolekulêre kragte/Van der Waals kragte in propaan-1-ol te oorkom of te breek as propanoon.*

OF

- Minder energie benodig om intermolekulêre kragte/Van der Waals kragte in verbinding D te oorkom as in verbinding C. (4)

3.3.1 Branching/Vertakking ✓ (1)

3.3.2

- From **A** to **C**: less branching/greater surface area ✓
- Stronger/more intermolecular forces (London forces) ✓
- More energy needed to break the intermolecular forces (London forces) ✓
- *Vanaf A tot C: minder vertakking/groter oppervlakte*
- *Sterker/meer intermolekulêre kragte (Londen-kragte)*
- *Meer energie benodig om die intermolekulêre kragte te breek (Londen-kragte)*

(3)

[15]

QUESTION 4/VRAAG 4


4.1.1 Elimination/dehydrohalogenation/dehydrobromination ✓
Eliminasie/dehidrohalogenering/dehidrobromering (1)

4.1.2 Substitution/hydrolysis/Substitusie/hidrolise ✓ (1)

4.1.3 Elimination/dehydration/*Eliminasie/dehidrasie* ✓ (1)

4.2.1 2-bromo ✓ propane/*propaan* ✓ (2)

4.2.2

**Notes/Aantekeninge:**

- Ignore/Ignoreer ⇐
- Any additional reactants and/or products./*Enige addisionele reaktante en/of ander produkte.* Max./Maks. $\frac{3}{4}$
- Accept coefficients that are multiples./*Aanvaar koëffisiënte wat veelvoude is.*
- Condensed or semi-structural formulae/Gekondenseerde of semi-struktuurformules: Max./Maks. $\frac{2}{4}$
- Molecular formulae/Molekulêre formules: Max./Maks. $\frac{2}{4}$


(4)

4.2.3 prope-1-ene/propene/prope-1-een/propeen ✓✓ (2)

4.3 X – concentrated strong base, heat/gekonsentreerde sterk basis, hitte ✓
Y – dilute strong base, mild heat/verdunde sterk basis, matige hitte ✓ (2)

4.4 Alcohol where the C atom bonded to hydroxyl/functional group (-OH) is bonded to two other carbon atoms. ✓✓
Alkohol waar die C-atoom gebind aan hidroksiel/funksionele groep (-OH) aan twee ander koolstofatome gebind is.

OR/OF

The functional group () is bonded to two other carbon atoms.
Die funksionele groep  *is aan twee ander koolstofatome gebind.* (2)
[15]

QUESTION 5/VRAAG 5

5.1.1 Exothermic/Eksotermies ✓

Energy of products is less than that of reactants/energy is given off/
 $\Delta H < 0$. ✓*Energie van produkte is minder as dié van reaktanse/energie wat afgegee word $\Delta H < 0$.* (2)

5.1.2 (a) A ✓ (1)

(b) A – C ✓✓ (2)

(c) C – B ✓✓ (2)

5.2.1 The amount of a substance per volume of water/solution ✓✓

Die hoeveelheid van 'n stof per volume water/oplossing (2)

5.2.2 Zinc/Zn ✓ (1)

5.2.3 $n(H_2) = \frac{V}{V_m}$ ✓

$= \frac{0,4144}{22,4}$ ✓

$= 0,0185$ mol

$n(Zn) = n(H_2) = 0,0185$ mol ✓

$m(Zn) = n(Zn) \times M$

$= 0,0185 \times 65$ ✓


$= 1,2025$ g ✓

(RANGE/GEBIED: 1,19 g to 1,3 g) (5)

5.2.4 (a) DECREASES/AFNEEM ✓ (1)

- (b) • Decrease in surface area/Afname in oppervlakte ✓
 • Fewer particles with correct orientation/Minder deeltjies met korrekte oriëntasie ✓
 • Fewer effective collisions per unit time/Minder effektiewe botsings per eenheidstyd ✓ (3)

5.2.5

**Note: If both graphs are not labelled****Let Wel: Indien beide grafiek nie benoem is nie 0/2** (2)
[21]

QUESTION 6/ VRAAG 6

- 6.1 A system that is isolated from its surroundings./A system where substances cannot leave/escape the container. ✓✓
'n Sisteem wat van sy omgewing geïsoleer is./'n Sisteem waar stowwe nie die houer kan verlaat/ontsnap nie. (2)

6.2 OPTION/OPSIE 1**CALCULATIONS USING NUMBER OF MOLES/
BEREKENINGE MET GEBRUIK VAN AANTAL MOL****Mark allocation/Puntetoekenning:**

- (a) Change $n(H_2)$ = equilibrium $n(H_2) = 0,02$
Verandering $n(H_2)$ = ewewig $n(H_2) = 0,02$
- (b) **USING** ratio $HI:H_2:I_2 = 2:1:1$
GEBRUIK verhouding $HI:H_2:I_2 = 2:1:1$
- (c) Equilibrium mole of I_2 = Change mole I_2 ✓
Ewewig mol van I_2 = Verander mol I_2
- (d) Divide 0,02 by 5 AND multiplying 0,0316 by 5 ✓
Deel 0,02 deur 5 EN vermenigvuldig 0,0316 met 5
- (e) Correct K_c expression (formulae in square brackets) ✓
Korrekte K_c uitdrukking (formules tussen vierkantige hakies)
- (f) Substitution of K_c 0,016
Vervanging van K_c 0,016
- (g) Substitution of concentrations into K_c expression ✓
Vervanging van konsentrasies in K_c uitdrukking
- (h) Initial mole of HI = Equilibrium + Change = 0,198 mol ✓
Range/Gebied: 0,19 – 0,2 mol

	HI	H_2	I_2	
Initial quantity (mol) <i>Aanvanklike hoeveelheid (mol)</i>	0,198✓(h)		0	
Change/Verander (mol)	0,04	0,02	0,02	ratio ✓(b) <i>verhouding</i>
Quantity at equilibrium (mol) $n = cv$ <i>Hoeveelheid by ewewig (mol)</i> $n = cv$	0,158	0,02	0,02	✓(c)
Equilibrium concentration ($\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$) <i>Ewewig konsentrasie ($\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$)</i>	0,0316	0,004	0,004	✓(d)

$$\begin{aligned}
 K_c &= \frac{[H_2][I_2]}{[HI]^2} \quad \checkmark(e) \\
 \checkmark(f) \quad 0,016 &= \frac{(0,004)^2}{[HI]^2} \quad \checkmark(g) \\
 [HI] &= 0,0316 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}
 \end{aligned}$$

Memorandum/Nasienriglyne

Wrong K_c expression/Verkeerde K_c uitdrukking	Max/Maks: 5/8
No K_c expression followed by correct substitutions/Geen K_c -uitdrukking nie gevolg deur korrekte vervangings	Max/Maks: 7/8

OPTION/OPSIE 2

**CALCULATIONS USING CONCENTRATIONS/
BEREKENINGE MET GEBRUIK VAN KONSENTRASIES****Mark allocation/Puntetoekenning:**

- (a) Change $[H_2]$ = equilibrium $[H_2] = 0,04$
Verandering $[H_2]$ = ewewig $[H_2] = 0,04$
- (b) **USING** ratio $Hl:H_2:I_2 = 2:1:1$
GEBRUIK verhouding $Hl:H_2:I_2 = 2:1:1$
- (c) Equilibrium concentration of I_2 = Change concentration $I_2 \checkmark$
Ewewig konsentrasie van I_2 = Verander konsentrasie I_2
- (d) Correct K_c expression (formulae in square brackets) \checkmark
Korrekte K_c uitdrukking (formules tussen vierkantige hakies)
- (e) Substitution of concentrations into K_c expression \checkmark
Vervanging van konsentrasies in K_c uitdrukking
- (f) Substitution of $K_c 0,016$
Vervanging van $K_c 0,016$
- (g) Initial concetration of Hl = Equilibrium + Change \checkmark
Aanvanklike konsentrasie van Hl = Ekwilibrium + Verandering
- (h) Devide 0,2 by 5 AND multiplying ,0396 by 5
Deel 0,2 deur 5 EN vermenigvuldig ,0396 met 5
Range/Gebied: $0,19 - 0,2$ mol

$$\text{Equilibrium/Ewewig } [H_2] = \frac{0,02}{5} = 0,004 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3} \quad (h) \checkmark$$

	Hl	H_2	I_2
Initial quantity (concentration) Aanvanklike hoeveelheid (konsentrasie)	0,0396 \checkmark (g)		0
Change (concentration) Verander (konsentrasie)	0,008	0,004	0,004
Equilibrium concentration (mol·dm ⁻³) Ewewig konsentrasie (mol·dm ⁻³)	0,0316	0,004	0,004

ratio \checkmark (b)
verhouding
 \checkmark (c)

$$K_c = \frac{[H_2][I_2]}{[Hl]^2} \quad (d) \checkmark$$

$$\checkmark (f) 0,016 = \frac{(0,004)^2}{[Hl]^2} \quad \checkmark (e)$$

$$[Hl] = 0,0396 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$$

$$n(Hl)\text{initial/aanvanklike} = 0,0396 \times 5$$

$$= 0,198 \text{ mol}$$

(8)

Memorandum/Nasienriglyne

Wrong K_c expression/Verkeerde uitdrukking:	Max/Maks: 5/8
No K_c expression followed by correct substitutions/Geen K_c -uitdrukking nie gevolg deur korrekte vervangings:	Max/Maks: 7/8

6.3.1 Decreases/Neem af ✓ (1)

6.3.2 Remains the same/Bly dieselfde ✓ (1)

6.4 Endothermic ✓

- K_c decreases with a decrease in temperature ✓
- Reverse reaction is favoured/concentration of reactants increases/concentration of products decreases/yield decreases ✓
- Decrease in temperature favours an exothermic reaction ✓

Endotermies

- K_c neem af met 'n afname in temperatuur
- Omgekeerde reaksie word bevoordeel/konsentrasie van reaktanse neem toe/konsentrasie van produkte neem af/opbrengs neem af
- Afname in temperatuur bevoordeel 'n eksotermiese reaksie

(4)

[16]

QUESTION 7/VRAAG 7

7.1.1 It dissociates/ionises completely✓ in water. ✓

Dit dissoosieer/ioniseer heeltemal in water.

(2)

7.1.2

Marking criteria/Nasienriglyne:

- Formula/Formule $n = \frac{m}{M}$ ✓
- Substitute/Vervang 58 in $n = \frac{m}{M}$ ✓
- USING** ratio/GEBRUIK verhouding $n(\text{H}_2\text{SO}_4) : n(\text{Mg}(\text{OH})_2) = 1:1$ ✓
- Substitute/Vervang 1,5 and/en 0,03448 in $n = cV$ ✓
- $n(\text{H}_2\text{SO}_4)_{\text{final}} = n_{\text{initial}} - n_{\text{reacted}}$ ✓
- Substitute/ Vervang $n(\text{H}_2\text{SO}_4)_{\text{final}}$ and/en 0,03 in $c = \frac{n}{V}$ ✓
- Final answer/Finale antwoord: $0,5 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ ✓
Range/Gebied: $0,5$ to $0,67 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$

 $n(\text{MgOH}):$

$$n = \frac{m}{M} \quad \checkmark \quad (\text{a})$$

$$= \frac{2}{58} \quad \checkmark \quad (\text{b})$$

$$= 0,03448 \text{ mol}$$

 $n_{\text{reacted}}(\text{H}_2\text{SO}_4) = n(\text{MgOH})$ $n(\text{H}_2\text{SO}_4) = 0,03 \text{ mol} \quad \checkmark \quad (\text{c})$ $n_{\text{initial}}(\text{H}_2\text{SO}_4) = c \times V$

$$= 1,5 \times 0,03 \quad \checkmark \quad (\text{d})$$

$$= 0,05 \text{ mol}$$

$$n_{\text{final}}(\text{H}_2\text{SO}_4) = 0,05 - 0,03 \quad \checkmark \quad \checkmark \quad (\text{e})$$

$$= 0,02 \text{ mol}$$

$$[\text{H}_2\text{SO}_4] \quad c = \frac{n}{V}$$

$$= \frac{0,02}{0,03} \quad \checkmark \quad (\text{f})$$

$$= 0,67 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3} \quad \checkmark \quad (\text{g})$$

(8)

Memorandum/Nasienriglyne

- 7.2.1 Contain a small amount (number of moles) of acid ✓ in proportion to the volume of water. ✓
Bevat 'n klein hoeveelheid (aantal mol) suur in verhouding tot die volume water. (2)


- 7.2.2 $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$ ✓
 $\text{pH} = -\log(0,15)$ ✓
 $\text{pH} = 0,82$ ✓ (3)

- 7.3.1 Basic/Basis ✓ (1)

7.3.2

Marking criteria/Nasienkriteria:

- a) Reactants/Reaktanse ✓ Products/Produkte ✓
Balancing/Balansering ✓
- b) Ignore single arrows and phases/Ignoreer enkel pyle en fases
- c) Marking rule/Nasienreeël 3.10



QUESTION 8/VRAAG 8

- 8.1 Completes the circuit/maintains electrical neutrality/provides path for movement of ions. ✓
Voltooï die stroombaan/handhaaf elektriese neutraliteit-verskaf pad vir beweging van ione. (1)
- 8.2 Cu ✓ (1)
- 8.3.1 CuSO₄/copper(II) sulphate/koper(II)sulfaat ✓ (1)
 Accept: Salt that contains Cu²⁺ ions/Aanvaar: Sout wat Cu²⁺ ione bevat
- 8.3.2 AgNO₃/silver nitrate/silwernitraat ✓ (1)
 Accept: Salt that contains Ag⁺ ions/Aanvaar: Sout wat Ag⁺ ione bevat
- 8.4 Cu + 2Ag⁺ → Cu²⁺ + 2Ag ✓ ✓balancing/balansering (3)

Marking criteria/Nasienkriteria:

- Reactant/Reaktanse ✓ Products/Produkte ✓
 Balancing/Balansering ✓
- Ignore double arrows/Ignoreer dubbel pyle
- Marking rule/Nasienreël 6.3.10

8.5 OPTION/OPSIE 1

$$\begin{aligned} E_{\text{cell}}^{\theta} &= E_{\text{reduction}}^{\theta} - E_{\text{oxidation}}^{\theta} \checkmark \\ &= 0,8 \checkmark - 0,34 \checkmark \\ &= 0,46 \text{ V} \checkmark \end{aligned}$$


Notes/Aantekeninge:

Accept any other correct formula from the data sheet.
Aanvaar enige ander korrekte formule vanaf gegewensblad.

Any other formula using unconventional abbreviations, e.g. E_{cell}^{θ} , followed by correct substitutions: $\frac{3}{4}$

Enige ander formule wat onkonvensionele afkortings gebruik, bv.

E_{cell}^{θ} , gevolg deur korrekte vervangings: $\frac{3}{4}$

OPTION/OPSIE 2

- 8.6 Temperature/Temperatuur: 25 °C/ 298 K ✓
 Concentration/Konsentrasie: 1 mol·dm⁻³ ✓

(2)

[13]

QUESTION 9/VRAAG 9

9.1 Electrical to chemical/Elektries tot chemies ✓✓ (2)

9.2 A solution that conducts electricity through the movement of ions ✓✓
'n Oplossing wat elektrisiteit geleei deur die beweging van ione (2)

9.3 (Electrode/Elektrode) A ✓ (1)

9.4 $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$ ✓✓

Marking criteria/Nasienkriteria:

- $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \Rightarrow \text{Cu}$ $\frac{1}{2}$ $\text{Cu} \Rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$ $\frac{0}{2}$
- $\text{Cu} \leftarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$ $\frac{2}{2}$ $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$ $\frac{0}{2}$
- Ignore if charge omitted on electron/Ignoreer as lading op elektron weggelaat is
- If charge (+) omitted on Cu^{2+} /Indien lading (+) weggelaat is op Cu^{2+}
Max./Maks: $\frac{1}{2}$
- Example/Voorbeeld: $\text{Cu}^2 + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$ (2)

9.5 Anode ✓ (1)

9.6.1 A yellow green gas/chlorine / Cl_2 gas will form ✓✓
'n Geelgroen gas/chloor/ Cl_2 gas sal vorm (2)

9.6.2 $2\text{C}\ell^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$ ✓✓

Marking criteria/Nasienkriteria:

- $2\text{C}\ell^- \Rightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$ $\frac{1}{2}$ $\text{Cl}_2 + 2\text{e}^- \Rightarrow 2\text{C}\ell^-$ $\frac{0}{2}$
- $\text{Cl}_2 + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{C}\ell^-$ $\frac{0}{2}$ $\text{Cl}_2 + 2\text{e}^- \leftarrow 2\text{C}\ell^-$ $\frac{2}{2}$
- Ignore if charge omitted on electron/Ignoreer as lading elektron op weggelaat is
- If charge (+) omitted on $\text{C}\ell^-$ /Indien lading (+) weggelaat is op $\text{C}\ell^-$:
Max./Maks: $\frac{1}{2}$
- Example/Voorbeeld: $2\text{C}\ell \rightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$ (2)

[12]

TOTAL/TOTAAL: 150